

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA  
PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE E EM ÁREA  
PROFISSIONAL DA SAÚDE  
PROGRAMA: SAÚDE COLETIVA

Resposta Recursal

**QUESTÃO 1** – Recurso deferido. Resposta correta opção E. “E) Estão corretas as afirmativas I, II, III e IV.”

**QUESTÃO 42** – Recurso indeferido.

22. Em termos práticos, entende-se a vigilância como a observação sistemática e contínua da frequência, da distribuição e dos determinantes dos eventos de saúde e suas tendências na população. São objetivos da vigilância:
A) Identificar, quantificar e monitorar os padrões das doenças nos indivíduos.
B) Planejar os programas, sem a necessidade de avaliar as medidas de prevenção e controle.
C) Detectar alterações na ocorrência e distribuição das doenças a longo prazo.
D) Observar as mudanças nos padrões de ocorrência dos agentes e hospedeiros de enfermidades relevantes para humanos.
E) Identificar, quantificar e monitorar as tendências das doenças nos indivíduos.
Alternativa Correta: D
Bibliografia da Questão (de onde a questão foi retirada): Módulos de Princípios de Epidemiologia para o Controle de Enfermidades. Módulo 4: vigilância em saúde pública/Organização Pan-Americana da Saúde. Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde; Ministério da Saúde, 2010.

A única alternativa correta é a D, uma vez que todas as demais apresentam afirmações incorretas e incompletas.

- A) Identificar, quantificar e monitorar **os padrões das doenças nos indivíduos**. (Correto: Identificar, quantificar e monitorar as tendências e padrões do processo saúde-doença nas **populações**)
- B) Planejar os programas, **sem a necessidade de avaliar** as medidas de prevenção e controle. (Correto: Planejar os programas de saúde e avaliar as medidas de prevenção e controle.)
- C) Detectar alterações na ocorrência e distribuição das doenças a **longo** prazo (Onde o correto seria detectar mudanças **agudas** na ocorrência e distribuição das doenças.
- D) **Alternativa correta**
- E) Identificar, quantificar e monitorar **as tendências das doenças nos indivíduos**. (onde o correto seria identificar, quantificar e monitorar as tendências e padrões do processo saúde-doença nas populações.)

**QUESTÃO 43** – Recurso deferido.

O enunciado correto deveria ter sido redigido sem a palavra **exceto** (de acordo com o exemplo descrito abaixo) para que a alternativa B fosse considerada a correta.

43. Os tipos fundamentais de vigilância que podem ser realizados nos serviços de saúde são:
A) Vigilância Passiva (onde cada nível de saúde envia informação de forma rotineira e periódica sobre os eventos sujeitos à vigilância ao nível imediatamente superior) e Vigilância Sentinela (baseada na informação proporcionada por um grupo selecionado como fonte de notificação do sistema - "unidades sentinelas" que se comprometem a estudar uma amostra pré-concebida - "amostra sentinela" de indivíduos de um grupo populacional específico, no qual é avaliada a presença de um evento de interesse para a vigilância).
B) Vigilância Passiva (onde cada nível de saúde envia informação de forma rotineira e periódica sobre os eventos sujeitos à vigilância ao nível imediatamente superior), Vigilância Ativa (onde a equipe de saúde recorre à fonte de informação para realizar uma busca intencional de casos do evento sujeito à vigilância) e Vigilância Sentinela (baseada na informação proporcionada por um grupo selecionado como fonte de notificação do sistema - "unidades sentinelas" que se comprometem a estudar uma amostra pré-concebida - "amostra sentinela" de indivíduos de um grupo populacional específico, no qual é avaliada a presença de um evento de interesse para a vigilância).
C) Vigilância Passiva (onde cada nível de saúde envia informação de forma rotineira e periódica sobre os eventos sujeitos à vigilância ao nível imediatamente superior) e Vigilância Ativa (onde a equipe de saúde recorre à fonte de informação para realizar uma busca intencional de casos do evento sujeito à vigilância).
D) Vigilância Ativa (onde a equipe de saúde recorre à fonte de informação para realizar uma busca intencional de casos do evento sujeito à vigilância) e Vigilância Sentinela (baseada na informação proporcionada por um grupo selecionado como fonte de notificação do sistema - "unidades sentinelas" que se comprometem a estudar uma amostra pré-concebida - "amostra sentinela" de indivíduos de um grupo populacional específico, no qual é avaliada a presença de um evento de interesse para a vigilância).
E) Vigilância Ativa (onde cada nível de saúde envia informação de forma rotineira e periódica sobre os eventos sujeitos à vigilância ao nível imediatamente superior), Vigilância Passiva (onde a equipe de saúde recorre à fonte de informação para realizar uma busca intencional de casos do evento sujeito à vigilância) e Vigilância Sentinela (baseada na informação proporcionada por um grupo selecionado como fonte de notificação do sistema - "unidades sentinelas" que se comprometem a estudar uma amostra pré-concebida - "amostra sentinela" de indivíduos de um grupo populacional específico, no qual é avaliada a presença de um evento de interesse para a vigilância).
Alternativa Correta: B
Bibliografia da Questão (de onde a questão foi retirada): Módulos de Princípios de Epidemiologia para o Controle de Enfermidades. Módulo 4: vigilância em saúde pública/Organização Pan-Americana da Saúde. Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde; Ministério da Saúde, 2010.
Página (de onde a questão foi retirada): 23

Se o enunciado não tivesse a palavra **exceto**, a alternativa correta seria a B, uma vez que apresenta informações corretas de acordo com o texto apresentado na página 23: Os tipos fundamentais de vigilância que podem ser realizados nos serviços de saúde são:

- **Vigilância passiva.** Nesse tipo de vigilância, cada nível de saúde envia informação de forma rotineira e periódica sobre os eventos sujeitos à vigilância ao nível imediatamente superior.

- **Vigilância ativa.** Nesse tipo de vigilância, a equipe de saúde recorre à fonte de informação para realizar uma busca intencional de casos do evento sujeito à vigilância. Os profissionais da equipe de saúde buscam diretamente os dados objetos de vigilância, revisando até mesmo os registros rotineiros do serviço de saúde e os registros diários de atenção às pessoas.
- **Vigilância sentinela.** Baseia-se na informação proporcionada por um grupo selecionado como fonte de notificação do sistema ("unidades sentinelas") que se comprometem a estudar uma amostra pré-concebida ("amostra sentinela") de indivíduos de um grupo populacional específico, no qual é avaliada a presença de um evento de interesse para a vigilância ("condição sentinela"). Esse tipo de vigilância permite estudar as tendências de certos eventos de interesse. Por extensão, o termo "vigilância sentinela" aplica-se a uma forma de vigilância seletiva do tipo comunitário que, por períodos curtos, coleta dados de uma população específica e geograficamente definida ("local sentinela") de especial interesse.

Uruguaiana, 09 de fevereiro de 2021.  
**Comissão de Seleção**